

**Def (Diagonalisierungsfunktion):**

Sei eine Gödelnummerierung  $g$  für die Theorie  $T$ , die mindestens die PA umfasse, gegeben.

Die Funktion

$$D : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}; \quad D(m) = \begin{cases} g(\alpha[\bar{m}]) & \text{falls } m \text{ die Gödelzahl einer} \\ & T\text{-Aussage } \alpha[x] \text{ ist} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

heißt Diagonalisierungsfunktion.

**Bem:** Bezeichnet man mit den 'Gödelhäkchen'  $\ulcorner \cdot \urcorner$  einer  $T$ -Aussage die Ziffer in PA der Gödelnummer dieser  $T$ -Aussage ( $\ulcorner \alpha \urcorner := \overline{g(\alpha)}$ ), so gilt

$$D(m) = D(g(\alpha[x])) = g(\alpha[\overline{g(\alpha[x])}]) = g(\alpha[\ulcorner \alpha[x] \urcorner])$$

$$\text{d.h. } D : g(\alpha[\ulcorner x \urcorner]) \rightarrow g(\alpha[\ulcorner \alpha[x] \urcorner])$$

**Lemma 3 (Diagonalisierungssatz):**

Sei  $T$  eine PA umfassende Theorie, in der  $D$  repräsentierbar sei.

Für jede  $T$ -Aussage  $\beta[x]$  (in der  $x$  die einzige freie Variable ist) gibt es eine geschlossene  $T$ -Aussage  $\sigma$  mit:

$$\vdash \sigma \equiv \beta[\ulcorner \sigma \urcorner]$$

$$(\ulcorner \sigma \urcorner := \overline{g(\sigma)})$$

Bew: Sei die  $T$ -Aussage  $\delta[x, x_2]$  die Repräsentation der Diagonalisierungsfunktion  $D$  in  $T$ .

$$\text{Sei } \alpha[x] := \bigwedge_{x_2} (\delta[x, x_2] \supset \beta[x_2]) \text{ und } m := g(\alpha[x]) \Rightarrow \bar{m} = \ulcorner \alpha[x] \urcorner$$

$$\text{Wähle } \sigma := \alpha[\bar{m}] = \bigwedge_{x_2} (\delta[\bar{m}, x_2] \supset \beta[x_2]) = \alpha[\ulcorner \alpha[x] \urcorner]$$

D.h.  $x$  wird ersetzt durch die Ziffer, die die Gödelnummer der Aussage  $\alpha[x]$  bezeichnet.

Dieses  $\sigma$  erfüllt dann die Anforderungen:

$$q := g(\sigma) \Rightarrow D(m) = g(\alpha[\bar{m}]) = g(\sigma) = q \Rightarrow D(m) = q. \text{ Wegen der Repräsentierbarkeit von } D \text{ in } T \text{ gilt: } \vdash \delta[\bar{m}, \bar{q}] \text{ (*). Weiter gilt } \bar{q} = \overline{g(\sigma)} = \ulcorner \sigma \urcorner$$

Gezeigt wird nun (1)  $\vdash \sigma \supset \beta[\bar{q}]$  und (2)  $\vdash \beta[\bar{q}] \supset \sigma$ , womit alles bewiesen ist.

zu (1): Folgendes ist eine T-Ableitung aus  $\sigma$  :

- (1)  $\sigma$  bzw.:  $\bigwedge_{x_2} (\delta[\bar{m}, x_2] \supset \beta[x_2])$  (Hyp)
- (2)  $\bigwedge_{x_2} (\delta[\bar{m}, x_2] \supset \beta[x_2]) \supset (\delta[\bar{m}, \bar{q}] \supset \beta[\bar{q}])$  (A4)
- (3)  $\delta[\bar{m}, \bar{q}] \supset \beta[\bar{q}]$  (MP)
- (4)  $\delta[\bar{m}, \bar{q}]$  (\*)
- (5)  $\beta[\bar{q}]$  (MP)

aus Deduktionstheorem folgt, da keine Gen verwendet:

$$\vdash \sigma \supset \beta[\bar{q}]$$

zu (2): Folgendes ist eine T-Ableitung aus  $\{\beta[\bar{q}], \delta[\bar{m}, x_2]\}$  :

- (1)  $\beta[\bar{q}]$  (Hyp)
- (2)  $\delta[\bar{m}, x_2]$  (Hyp)
- ....
- (3)  $\delta[\bar{m}, \bar{q}]$  (?)
- ....
- (4)  $\bigvee_{x_2}^1 \delta[\bar{m}, x_2]$  (Weil D repräsentierbar in T)
- ....
- (5)  $\bar{q} = x_2$  (2,3,4)
- ....
- (6)  $\beta[x_2]$

Also  $\{\beta[\bar{q}], \delta[\bar{m}, x_2]\} \vdash \beta[x_2]$

Nach Deduktionstheorem folgt:  $\{\beta[\bar{q}]\} \vdash \delta[\bar{m}, x_2] \supset \beta[x_2]$  (kein freies Vorkommen einer Variablen in  $\beta[\bar{q}]$ )

$$\{\beta[\bar{q}]\} \vdash \underbrace{\bigwedge_{x_2} (\delta[\bar{m}, x_2] \supset \beta[x_2])}_{\sigma} \quad (\text{Gen!}) \quad ( \quad " \quad )$$

Nach Deduktionstheorem weiter:  $\vdash \beta[\bar{q}] \supset \sigma$

**Def Beweisbeziehung:**

$P_f \subseteq \mathbb{N}^2$ :  $P_f(m, n) \Leftrightarrow$  Es gibt eine T-Aussage  $\alpha$  und eine Folge  $f$  von T-Aussagen, die einen T-Beweis von  $\alpha$  darstellen mit:  $m = g(\alpha)$  und  $n = g(f)$

**Satz 4 (Prä-Gödelsatz):**

Sei  $T$  eine durch  $g$  gödelnummerierte (konsistente und)  $\omega$ -konsistente Theorie 1. Ordnung mit PA, in der die (zu  $T$  und  $g$  gehörende) Diagonalisierungsfunktion  $D$  repräsentierbar und die (zu  $T$  und  $g$  gehörende) Beziehung  $P_f$  ausdrückbar ist.

Dann gibt es eine geschlossene T-Aussage  $\gamma$  mit der Eigenschaft:

$$\not\vdash \gamma \quad \text{und} \quad \not\vdash \neg\gamma$$

Bew: Sei  $\pi[x, x_2]$  eine T-Aussage, die die Pf-Beziehung ausdrückt.

$$\beta[x] := \bigwedge_{x_2} \neg\pi[x, x_2] \quad (\text{bzw. : } \bigwedge_{x_2} (x_2 \text{ nat. Zahl} \supset \neg\pi[x, x_2])$$

( $\beta[x]$  besagt also, dass  $x$  nicht beweisbar ist)

Mit dem Diagonalisierungssatz folgt, dass es eine geschlossene T-Aussage  $\gamma$  gibt

$$\text{mit: } M: \vdash \gamma \equiv \bigwedge_{x_2} \neg\pi[\ulcorner \gamma \urcorner, x_2]$$

( $M$  heißt also soviel wie: " $\gamma$  genau dann, wenn  $\gamma$  nicht beweisbar", gereinigte Aussage von "diese Aussage ist nicht beweisbar")

zu zeigen: (1)  $\not\vdash \gamma$  und (2)  $\not\vdash \neg\gamma$

(1): Annahme  $\vdash \gamma$ . Dann gibt es ein  $n \in \mathbb{N}$  (nämlich die Gödelzahl eines T-Beweises für  $\gamma$ ) mit  $\vdash Pf(g(\gamma), n)$ . Wegen der Ausdrückbarkeit von  $P_f$  in  $T$  heißt das:  $\vdash \pi[\ulcorner \gamma \urcorner, \bar{n}]$ . Aus  $M$  folgt wegen der Annahme  $\vdash \bigwedge_{x_2} \neg\pi[\ulcorner \gamma \urcorner, x_2]$

Mit (A4) folgt daraus:  $\vdash \neg\pi[\ulcorner \gamma \urcorner, \bar{n}]$  im Widerspruch zur Konsistenz.

(2): Aus (1) folgt  $\not\vdash \gamma$ . Wir nehmen an:  $\vdash \neg\gamma$ .

Mit  $M$  gilt auch  $\vdash \neg\gamma \equiv \neg \bigwedge_{x_2} \neg\pi[\ulcorner \gamma \urcorner, x_2]$ . Wegen der jetzigen Annahme folgt

damit:  $\vdash \neg \bigwedge_{x_2} \neg\pi[\ulcorner \gamma \urcorner, x_2]$  und  $\vdash \bigvee_{x_2} \pi[\ulcorner \gamma \urcorner, x_2]$  (\*). Wegen  $\not\vdash \gamma$  folgt für

alle  $n \in \mathbb{N}$  nicht  $\vdash Pf(g(\gamma), n)$ , was wegen der Ausdrückbarkeit von  $P_f$  bedeutet:

Für alle  $n \in \mathbb{N}$ :  $\vdash \neg\pi[\ulcorner \gamma \urcorner, \bar{n}]$ , was im Widerspruch zur  $\omega$ -Konsistenz steht.